

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕКСИДОЛА ПРИ “ИЗБЕГАЕМОМ” И “НЕИЗБЕГАЕМОМ” ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СТРЕССЕ У МЫШЕЙ ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ BALB/C И C57BL/6

О. Ю. Кравцова, Т. А. Воронина, А. К. Сариев¹

Изучено действие мексидола (100 мг/кг внутрь) у мышей инбредных линий BALB/C и C57BL/6 на моделях эмоционального стресса (“открытое поле”, “приподнятый крестообразный лабиринт”, “условный рефлекс пассивного избегания”). Установлено, что препарат после однократного введения оказывает селективное анксиолитическое действие на мышей линии BALB/C — животных с “пассивным” фенотипом эмоционально-стрессовой реакции (ЭСР) и не проявляет седативного эффекта у мышей линии C57BL/6 с “активным” фенотипом ЭСР.

Ключевые слова: мексидол, инбредные животные, эмоциональный стресс

ВВЕДЕНИЕ

В генетически гетерогенной популяции известна широкая вариабельность показателя тревожности, определяемая, прежде всего, различиями в наследственно контролируемых типах реакции на стресс. В связи с этим при проведении фармакологической коррекции нарушений поведения при эмоциональном стрессе следует учитывать индивидуальные особенности [1, 9]. В лечебной практике в качестве анксиолитического средства применяется препарат мексидол (2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцинат) [4, 5, 7]. В эксперименте на мышах инбредных линий показано, что мексидол в тесте “открытое поле” устраняет “реакцию замирания” (*freezing*) у мышей BALB/C, не оказывая при этом седативного действия на мышей C57BL/6 [9, 12].

Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение антистрессорного действия мексидола у беспородных мышей и мышей инбредных линий BALB/C и C57BL/6 с различными врожденными типами эмоционально-стрессовой реакции (ЭСР) в условиях “избегаемого” (тесты “приподнятый крестообразный лабиринт” и “условный рефлекс пассивного избегания”) и “неизбегаемого” (тест “открытое поле”) эмоционального стресса.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Опыты выполнены на мышах-самцах инбредных линий BALB/C и C57BL/6 и белых беспородных мышах-самцах массой 26–30 г, полученных из питомника Столбовая РАМН. Животных содержали в стандартных условиях вивария. Эксперименты проводили в интервале 10–16 ч. Водный раствор мексидола готовили заранее и вводили мышам в желудок с помощью металлического зонда за 30 мин до тестирования в дозе

100 мг/кг. Контрольные животные получали равный объем дистиллированной воды.

Тест “открытое поле” (ОП) проводили по стандартной методике [2, 3]. Поведение животных оценивали в течение трех минут, регистрируя горизонтальную двигательную активность (количество пересеченных квадратов), вертикальную активность (число вставаний на задние лапы), исследовательскую активность (число обследованных отверстий), а также количество болюсов (эмоциональность).

Тест “приподнятый крестообразный лабиринт” (ПКЛ) использовали в базовой модификации [3, 11], регистрируя в течение 5 мин: латентный период первого захода в рукав, время пребывания в открытых рукавах и на центральной площадке, число заходов в открытые и закрытые рукава, число выходов на центральную площадку.

Тест “условный рефлекс пассивного избегания” (УРПИ). Выработку условного рефлекса пассивного избегания у животных проводили в стандартной установке [2, 3]. Воспроизводимость УРПИ оценивали через 24 и 72 ч после обучения в течение трех минут, регистрируя латентный период первого захода в темный отсек, время нахождения в темном отсеке, число переходов между отсеками.

Полученные результаты обрабатывали статистически, используя *t*-критерий Стьюдента для сравнения независимых выборок. Для множественных сравнений использовали *t*-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Контрольные мыши BALB/C и C57BL/6, помещенные в ОП, проявляли разные фенотипы поведения. Мыши C57BL/6 характеризовались высоким уровнем двигательной активности (горизонтальной и вертикальной), а также низким уровнем дефекаций. У мышей линии BALB/C в ОП наблюдалась реакция замирания с высоким уровнем дефекаций (рис. 1). Как показано

¹ Лаборатории психофармакологии (руководитель — проф. Т. А. Воронина), фармакокинетики (руководитель — проф. В. П. Жердев) ГУ НИИ фармакологии им. В. В. Закусова РАМН, Москва, 125315, ул. Балтийская, 8.




Рис. 1. Влияние мексидола (100 мг/кг внутрь) на поведение мышей линий BALB/C (а) и C57BL/6 (б) в тесте "открытое поле" ($M \pm SEM$).

По оси абсцисс: 1 — общая двигательная активность, 2 — горизонтальная двигательная активность, 3 — вертикальная активность, 4 — исследовательская активность; по оси ординат: среднее число реакций животных за 3 мин. Светлые столбики — контрольные животные, темные столбики — животные, получавшие мексидол. * — $p < 0,05$ по сравнению с контролем, # — $p < 0,05$ между инбредными линиями.

ранее [9, 12] такие фенотипы поведения отражают высокий уровень исследовательской активности (мыши C57BL/6; "активный" фенотип ЭСР) и выраженную реакцию страха (мыши BALB/C; "пассивный" фенотип ЭСР).

Под влиянием мексидола (100 мг/кг) у мышей BALB/C наблюдалось увеличение горизонтальной двигательной и вертикальной активности, а также снижение числа фекальных болюсов (эмоциональности). Изменений в поведении "активных" мышей (C57BL/6) выявлено не было (рис. 1). Полученные результаты подтверждают полученные ранее данные, показавшие активацию поведения мышей BALB/C при




Рис. 2. Влияние мексидола (100 мг/кг внутрь) на латентный период первого захода в темный отсек (а) и число переходов между отсеками (б) в тесте "условный рефлекс пассивного избегания" у мышей инбредных линий и беспородных мышей ($M \pm SEM$).

По оси абсцисс: 1 — мыши линии BALB/C, 2 — мыши линии C57BL/6, 3 — беспородные мыши; по оси ординат: а — время, с; б — число переходов. Светлые столбики — контрольные животные, темные столбики — животные, получавшие мексидол. * — $p < 0,05$ по сравнению с контролем, # — $p < 0,05$ по сравнению с беспородными животными.

использовании мексидола в более низкой дозе — 50 мг/кг [8]. У беспородных мышей мексидол в дозе 100 мг/кг не вызывал достоверного изменения исследуемых параметров.

Сравнительный анализ поведения мышей линий BALB/C и C57BL/6, проведенный в тесте ПКЛ, пока-

Влияние мексидола (100 мг/кг, внутрь) на мышей инбредных линий и беспородных мышей в тесте "приподнятый крестообразный лабиринт" ($M \pm SEM$)

Параметр теста	Мыши					
	BALB/C		C57BL/6		беспородные	
	Контроль (n = 15)	Мексидол (n = 17)	Контроль (n = 9)	Мексидол (n = 9)	Контроль (n = 17)	Мексидол (n = 17)
Время пребывания в открытых рукавах, с	20,53 ± 2,55	39,76 ± 5,99*	12,67 ± 3	17,33 ± 4,23	13,29 ± 2,45	13,71 ± 2,9
Время пребывания на центральной площадке, с	49 ± 4,04	41,18 ± 4,56	28,78 ± 2,16#	33,44 ± 3,46	45,76 ± 6,51	55,53 ± 8,28
Латентный период первого захода в рукав, с	2,6 ± 0,8	3,94 ± 0,52	2,33 ± 0,5	1,11 ± 0,11*	1,77 ± 0,33	1,94 ± 0,29
Число заходов в открытые рукава	3,13 ± 0,39	3,47 ± 0,58	2,89 ± 0,59	3,67 ± 0,78	2 ± 0,4	2,29 ± 0,44
Число заходов в закрытые рукава	7,87 ± 0,7	8,77 ± 1,03	8,22 ± 1,1	8,11 ± 1,01	10,71 ± 0,99	9,12 ± 0,54
Число выходов на центральную площадку	6,53 ± 0,74	6,06 ± 0,7	6,33 ± 0,71	5,78 ± 0,57	7,41 ± 0,91	7,65 ± 0,71
Общее число заходов в рукава	11 ± 1,01	12,2 ± 41,34	11,11 ± 1,62	11,78 ± 1,66	12,71 ± 1,07	11,41 ± 0,63

* — $p < 0,05$ по сравнению с контролем.

— $p < 0,05$ между инбредными линиями.

зал, что указанные линии животных практически не различаются по большинству оцениваемых в данном тесте показателей поведения. Только время задержки мышей BALB/C в центре лабиринта было достоверно выше аналогичного показателя, регистрируемого у животных линии C57BL/6 (таблица). Сходные данные получены другими авторами [6].

Мексидол увеличивал время нахождения в открытых рукавах у мышей BALB/C (таблица), что указывает на его выраженное анксиолитическое действие. У мышей C57BL/6 под действием препарата уменьшался латентный период первого захода в рукав. На поведение беспородных мышей мексидол влияния не оказывал.

Поведение контрольных BALB/C и C57BL/6 в тесте УРПИ не различалось. Большую часть тестируемого времени животные проводили в светлом отсеке.

Мексидол изменял поведение животных в тесте УРПИ на третьи сутки после стресса. Препарат снижал латентный период первого захода мышей BALB/C в темный отсек (рис. 2, а) и в 3,6 раза увеличивал время их нахождения в опасном отсеке, повышая в то же время число переходов между отсеками (рис. 2, б). Изменений в поведении мышей C57BL/6 под влиянием мексидола не наблюдалось. Полученные результаты демонстрируют, что мексидол активизирует поведение мышей BALB/C (уменьшение латентного периода первого захода в темный отсек и возросшее число переходов между отсеками) и не влияет на “активных” животных (C57BL/6), проявляя свойства селективного анксиолитика.

Таким образом, мексидол (100 мг/кг) в условиях всех трех тестов устраняет реакцию страха, freezing, у мышей BALB/C, не оказывая при этом седативного действия на мышей C57BL/6, что свидетельствует о его селективном анксиолитическом действии на животных с “пассивным” фенотипом ЭСР.

Возможно, различие в антистрессорном действии мексидола у мышей BALB/C и C57BL/6 обусловлено межлинейными различиями в бензодиазепиновой рецепции у лабораторных животных, отличающихся по фенотипу поведения в стрессовых ситуациях. Из литературы известно, что после эмоционально-стрессового воздействия в тесте ОП наблюдается резкое падение связывания меченного лиганда (³H-диазепама) у мышей BALB/C, в то время как у мышей C57BL/6 параметры рецепции не меняются [10]. Уменьшение бензодиазепиновой рецепции у мышей BALB/C приводит к ослаблению у них ГАМК-ергических процессов, что имеет следствием анксиогенный эффект, сопровождаемый реакцией замирания. У мышей C57BL/6 подобные изменения не возникают, что и обуславливает их стрессустойчивость [10]. Анксиоселективный препарат афобазол препятствует развитию нарушений в ГАМК-бензодиазепиновом комплексе у мышей

BALB/C (“пассивных” животных) при стрессе и проявляет избирательный анксиолитический эффект [9]. Можно предположить, что подобный механизм действия имеет и мексидол. Не обладая прямым аффинитетом к бензодиазепиновым и ГАМК-рецепторам, мексидол, вероятно, может оказывать на них модифицирующее действие, аллостерически потенцируя рецептор лиганда и активируя ионные каналы, тем самым усиливая способность рецепторного комплекса к связыванию [8, 13].

Выводы

1. Мексидол увеличивает у мышей BALB/C время нахождения в открытых рукавах и не изменяет поведение мышей C57BL/6 в тесте “приподнятый крестообразный лабиринт”.

2. Мексидол уменьшает латентный период первого захода в темный отсек и повышает число переходов между отсеками у мышей BALB/C в тесте “условный рефлекс пассивного избегания”, что свидетельствует о его анксиолитическом эффекте.

3. Селективное анксиолитическое действие мексидола проявляется у мышей BALB/C с “пассивным” фенотипом эмоционально-стрессовой реакции в условиях “избегаемого” и “неизбегаемого” эмоционального стресса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ю. А. Бледнов, М. М. Козловская, М. Маула, *Тез. докл. на 2-ой Международ. конференции: “Выживание человека: резервные возможности и нетрадиционная медицина”*, Москва, 24 – 25 августа, 1994, Москва (1994), сс. 61 – 62.
2. Я. Буреш, О. Бурешова, Дж. П. Хьюстон, *Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения*, Высшая школа, Москва (1991).
3. Т. А. Воронина, С. Б. Середенин, *Методические указания по изучению транквилизирующего (анксиолитического) действия фармакологических веществ / Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ*, Ремедиум, Москва (2000), сс. 26 – 130.
4. Т. А. Воронина, *Психофармакол. и биол. наркол.*, № 1, 2 – 12 (2001).
5. К. М. Дюмаев, Т. А. Воронина, Л. Д. Смирнов, *Антиоксиданты в профилактике и терапии патологий ЦНС*, Изд. Инст-та биомед. химии РАНН, Москва (1995).
6. Мона Ассад Маула, *Автореф. дис. канд. биол. наук*, Москва (1996).
7. Г. Г. Незнамов, Е. С. Телешова, Т. П. Сафарова и др., *Материалы международного симпозиума “Биоантиоксидант”*, Тюмень (1997), сс. 85 – 87.
8. С. Б. Середенин, Ю. А. Бледнов, М. Л. Гордей и др., *Хим.-фарм. ж.*, № 2, 134 – 137 (1987).
9. С. Б. Середенин, Т. А. Воронина, Г. Г. Незнамов и др., *Вестн. РАНН*, № 11, 3 – 9 (1998).
10. С. Б. Середенин, М. А. Яркова, М. В. Воронин, *Экспер. и клин. фармакол.*, 64(1), 63 – 65 (2001).

11. E. Pellow, P. Chopin, S. E. File, and M. Briley, *J. Neurosci. Methods.*, **14**, 149 – 167 (1985).
12. S. B. Seredenin and Y. A. Blednov, *Biological basis of individual sensitivity to psychotropic drug*, Edinburgh (1995), 25 – 38.
13. T. A. Voronina and S. B. Seredenin, *Ann. Ist. Super. Sanita.*, **24**, 461 – 466 (1988).

Поступила 23.03.04

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF MEXIDOL IN ESCAPABLE AND INESCAPABLE EMOTIONAL STRESS IN INBRED BALB/C AND C57BL/6 MICE

O. Yu. Kravtsova, T. A. Voronina, and A. K. Sariev

Zakusov Institute of Pharmacology, Russian Academy of Medical Sciences, Baltiiskaya ul. 8, Moscow, 125315 Russia

The effect of mexidol administered in a dose of 100 mg/kg (i.p.) was studied in BALB/C and C57BL/6 mice on various emotional stress models including open field test, elevated plus-maze test, and passive avoidance conditioned reflex. Upon a single administration, the drug produces a selective anxiolytic action on BALB/C mice (experimental animals with a "passive" phenotype of the emotional stress reaction), while not inducing any sedative (tranquilizer) effect in C57BL/6 mice (belonging to the phenotype with "active" emotional stress reaction).

Экспериментальная и клиническая ФАРМАКОЛОГИЯ

Том 67

2004

EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY

ноябрь — декабрь

№ 6

ДВУХМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОСНОВАН В ИЮНЕ 1938 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Нейрофармакология

- Калуев А. В., Нутт Д. Дж.* Новые направления ГАМК-ергической фармакологии тревоги и депрессии 3
- Кравцова О. Ю., Воронина Т. А., Сариев А. К.* Исследование действия мексидола при "избегасмом" и "неизбегасмом" эмоциональном стрессе у мышей инбредных линий BALB/C и C57BL/6 8
- Шабанов П. Д., Лебедев А. А.* Сопоставление эффектов фенамина и его аналога диметоксиметамфетамина на самостимуляцию мозга у крыс после перинатального введения 6-гидроксидафамина 12
- Молодавкин Г. М., Садиков М. К., Воронина Т. А., Садикова З. У., Мелетова О. К., Пчелкина М. И., Ларенцова Л. И., Ганьшина Т. С., Мирзоян Р. С.* Влияние анксиолитиков на поведение и электрофизиологические показатели крыс при сосудистой патологии мозга 16
- Караев А. Л., Козлова Г. С., Смирнова Т. Н., Гунар В. И.* Сравнительное исследование кето-пантоиламинобутирата кальция и пантогама: изучение седативной активности 20
- Арушанян Э. Б., Мастягина О. А., Мастягин С. С., Попова А. П.* Некоторые особенности влияния тофизопама и экстракта валерианы на память и тревожность у человека 23

Фармакология сердечно-сосудистой системы

- Платонов А. А., Ласукова Т. В., Маслов Л. Н., Дауни Дж. М., Нагазе Х., Овчинников М. В.* Агонисты δ -опиоидных рецепторов предупреждают появление необратимых повреждений кардиомиоцитов при ишемии — реперфузии изолированного сердца 26
- Каверина Н. В., Чичканов Г. Г., Цорин И. Б.* Противофибрилляторное действие антиаритмических средств различных классов в условиях активации парасимпатической нервной системы 30
- Маслов Л. Н., Крылатов А. В., Лишманов Ю. Б., Бергер Х., Кало Дж., Ма Л., Соленкова Н. В., Стахеев Д. Л.* К механизму антиаритмического действия эндогенного агониста ORL1 рецепторов ноцицептина 32
- Андреева Г. Ф., Горбунов В. М., Айвазян Т. А., Исайкина О. Ю., Воронина В. П., Лерман О. В.* Влияние телмисартана на психологический статус и качество жизни больных со стабильной артериальной гипертензией 36

CONTENTS

Neuropharmacology

- A. V. Kaluev and D. J. Nutt* New directions in gabaergic pharmacology of anxiety and depression 3
- O. Yu. Kravtsova, T. A. Voronina, and A. K. Sariev* Investigation of the effects of mexidol in escapable and inescapable emotional stress in inbred BALB/C and C57BL/6 mice 8
- P. D. Shabanov and A. A. Lebedev* Comparative study of the effects of amphetamine and dimethoxymethamphetamine on brain self-stimulation in rats after perinatal administration of 6-hydroxydopamine 12
- G. M. Molodavkin, M. K. Sadykov, T. A. Voronina, Z. U. Sadykova, O. K. Meletova, M. I. Pchelkina, L. I. Larentsova, T. S. Gan'shina, and R. S. Mirzoyan* Effect of typical and atypical anxiolytics on the behavior and electrophysiological parameters of rats with model cerebrovascular pathology 16
- A. L. Karaev, G. S. Kozlova, T. N. Smirnova, and V. I. Gunar* Comparative investigation of calcium ketopantoylaminobutyrate and pantogam: tranquilizer activity 20
- E. B. Arushanyan, O. A. Mastyagina, S. S. Mastyagin, and A. P. Popova* Peculiarities in the effect of tofisopam and valerian extract on short-term memory and anxiety states in healthy humans 23

Cardiovascular Pharmacology

- A. A. Platonov, T. V. Lasukova, L. N. Maslov, J. M. Downey, H. Nagaze, and M. V. Ovchinnikov* δ -Opioid receptor agonists prevent the irreversible damage of cardiomyocytes in ischemized-reperfused isolated rat heart 26
- N. V. Kaverina, G. G. Chichkanov, and I. B. Tsorin* Antifibrillatory effect of antiarrhythmic drugs of various classes under conditions of activation of the parasympathetic nervous system 30
- L. N. Maslov, A. V. Krylatov, Yu. B. Lishmanov, H. Berger, G. Calo, L. Ma, N. V. Solenkova, and D. L. Stakheev* The mechanism of antiarrhythmic action of the endogenous ORL1 receptor agonist nociceptin 32
- G. F. Andreeva, V. M. Gorbunov, T. A. Aivazyan, O. Yu. Isaikina, V. P. Voronina, and O. V. Lerman* Effect of telmisartan on the psychological state and quality of life in stable hypertension patients 36

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
РАМН

Фармакология желудочно-кишечного тракта		Pharmacology of the Gastrointestinal Tract	
<i>Доркина Е. Г.</i> Изучение гепатопротекторного действия природных флавоноидных соединений	41	<i>E. G. Dorkina</i> Investigation of the hepatoprotector action of natural flavonoids	41
Фармакология репродуктивной системы		Pharmacology of the Reproductive System	
<i>Смольникова Н. М., Немова Е. П., Сорокина А. В., Вальдман Е. А., Дурнев А. Д.</i> Влияние гимантана на генеративную функцию и морфологию гонад	45	<i>N. M. Smolnikova, E. P. Nemova, A. V. Sorokina, E. A. Val'dman, and A. D. Durnev</i> The effect of hemantane on the generative function and gonad morphology in rats	45
Фармакология обмена веществ		Pharmacology of the Metabolism	
<i>Быков И. Л.</i> Влияние L-карнитина на метаболические нарушения при экспериментальной недостаточности ацил-КоА дегидрогеназ	48	<i>I. L. Bykov</i> Effect of L-carnitine on metabolic disorders in rats with experimental acyl-CoA dehydrogenase deficiency	48
<i>Ахматов А. Т., Сибиряк С. В., Симбирцев А. С., Сибиряк Д. С.</i> Влияние рекомбинантного интерлейкина-1 β (rIL-1 β , беталейкин) на цитохром Р-450-зависимые монооксигеназы печени и почек у крыс	53	<i>A. T. Akhmatov, S. V. Sibiryak, A. S. Simbirtsev, and D. S. Sibiryak</i> The effect of recombinant interleukin 1 β on cytochrome P-450 dependent monooxygenases in rat liver and kidney	53
Фармакокинетика		Pharmacokinetics	
<i>Крайнова Т. А., Ефремова Л. М., Шерер Л. А., Миловидова О. В., Наумова Ю. К., Анастасиев В. В.</i> Динамика изменения оксидативной активности плазмы при различных способах введения препарата церулоплазмин.	58	<i>T. A. Krainova, L. M. Efremova, K. A. Sherer, O. V. Milovidova, Yu. K. Naumova, and V. V. Anastasiev</i> Dynamics of oxidase activity in blood plasma upon intravenous and intramuscular administration of ceruloplasmin.	58
Токсикология лекарственных средств		Toxicology of Drugs	
<i>Карпова Г. В., Абрамова Е. В., Ламзина Т. Ю., Тимина Е. А., Ветошкина Т. В.</i> О миелотоксичности высокомолекулярного полиэтиленоксида	61	<i>G. V. Karpova, E. V. Abramova, T. Yu. Lamzina, E. A. Timina, and T. V. Vetoshkina</i> Myelotoxicity of high-molecular-weight poly(ethylene oxide)	61
Новые препараты		New Drugs	
<i>Свищенко Ю. А., Шимановский Н. Л.</i> Расширение возможностей использования бисфосфонатов для профилактики и лечения костных осложнений при злокачественном метастазировании	66	<i>Yu. A. Svishchenko and N. L. Shimanovskii</i> Expanding the possibilities of using biphosphonates for prophylaxis and treatment of osteal complications in malignant metastasis	66
Юбилей		Anniversary	
М. Д. Гаевый (к 75-летию со дня рождения)	72	М. Д. Gaevyi (On his 75th birshday)	72
Тематический указатель статей, опубликованных в 2004 г.	73	Index of articles published in 2004	73

Подписано в печать 10.12.2004. Формат 60 × 80 1/8.

Оригинал-макет выполнен в издательстве "Фолиум",
127238, Москва, Дмитровское ш., 58, тел./факс (095) 482-5590, 482-5544
Internet: <http://www.folium.ru>, E-mail: ekf@folium.ru
Отпечатано в типографии издательства "Фолиум"

Издательство "Фолиум", 2004